

淋病 (Gonorrhea)

淋病是由一種細菌引起的性病。淋病能傳染給男性和女性。它是在性交、肛交及口交過程中由一個人傳染給另一個人的。淋病可以從喉、陰道、尿道和肛門內發現。嬰兒在生產過程中能受感染，引起眼炎。

淋病有哪些症狀？

男性：在碰到病菌后十天內通常會出現症狀。

- * 陰莖頭或肛門有分泌
- * 陰莖頭痛或癢
- * 偶然會有陰莖紅腫
- * 小便時痛
- * 偶然，在沒有醫治的情況下，陰莖有分泌然後消失，但你仍受感染。

女性：

- * 陰道有分泌
- * 下腹部痛，特別在性交時
- * 異常的陰道或直腸流血，附帶痛性痙攣
- * 小便時痛
- * 經常，婦女完全沒有症狀，但仍受感染

如果淋病感染到喉部，通常是沒有症狀的，雖然有可能引起「咽喉痛」。由口與陰莖的性接觸比口與陰道的性接觸更能把淋病傳染到喉部。研究說明，在沒有醫治的情況下，在喉部的淋病會在三個月內自動消失。

淋病嚴重嗎？

- * 是，特別對婦女。婦女能患上骨盆腔炎，一種嚴重的惡化。骨盆腔炎的細菌從陰道走到子宮頸，又再進入子宮、輸卵管及卵巢。阻塞和結疤能引起輸卵管的損害，并使婦女較容易「宮外孕」。
- * 男性偶然會患附睪炎，一種會產生痛感和不育（精液不流通）的陰囊炎。

淋病是怎樣醫治的？

- * 你的醫生會給你抗菌素殺傷你體內的淋病菌。在醫治后避免性交一周。
- * 你和你的性伴侶必須接受檢查和醫治。如果不醫治，他們會把病毒再傳染給你，或傳染給其他人。

我怎麼避免患淋病？

- * 每次性交都用安全套。
- * 預早計劃。在與新性伴侶性交之前商談有關性病的問題及用安全套的必要性。性交之前，爲你自己和你的新性伴侶做一次性病檢查。

如果你在性交或肛交過程中接觸到淋病，又不知道你的性伴侶是否有HIV愛滋病毒，你應擔心會增加感染愛滋病毒的危險性。請與你的醫生商談。

警告：愛滋病也是一種性病。所有性病都是因爲不安全性交而傳染擴散的。當你感染到性病，你也可能染上愛滋病。保護自己 — 使用安全套！

若需要檢查性病或治療
請洽你的醫生、本地診所或前來：

市立診所
七街 356 號
(Folsom 福森街 夾 Harrison 哈利遜街)
三藩市 加州 94103