

Indicaciones para el Tratamiento de Parejas Sexuales con Clamidia y Gonorrea (Azithromycin 1 gm y Cefpodoxime 400mg)

POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE

Porque es necesario que yo tome esta medicina?

Recientemente su pareja sexual ha recibido tratamiento para *Clamidia* y *Gonorrea*. *Clamidia* y *Gonorrea* son infecciones curables que se puede adquirir cuando se tiene relaciones sexuales con alguien que ya las tiene. Muchas personas con estas infecciones no saben que las tienen porque aparentemente se sienten bien y no tienen síntomas. Sin embargo, si usted no se toma la medicina para curarse, se puede poner muy enfermo/a.

Usted podría tener *Clamidia* y *Gonorrea*. Es importante que reciba tratamiento. Nosotros queremos estar seguros que usted reciba la medicina lo mas pronto posible. La mejor manera de cuidarse es de ver a un doctor o venir a City Clinic para un chequeo y medicina. Si usted no puede ir con su doctor o venir a City Clinic dentro de una semana, debería de tomarse la medicina que esta incluida con este folleto.

Es esta medicina segura?

Esta medicina es muy segura. Sin embargo, debería de hablar con su doctor o venir a City Clinic si tiene unos de los problemas que se encuentra en la siguiente lista. **NO TOME la medicina si:**

- Usted esta, piensa que esta o planea estar embarazada
- Usted es una mujer y tiene dolor de estomago, dolor al tener relaciones sexuales, vomito o fiebre
- Usted es un hombre y tiene dolor o inflamacion en los testiculos o fiebre
- Usted ha tenido una reaccion, sarpullido o alergia a Azithromycin, Zithromax, Erythromycin, Clarithromycin o Biaxin
- Usted ha tenido una reccion, sarpullido o alergia a Cefpodoxime (Vantin), a cualquier Cephalosporin (antibioticos que comienzan con cef- o ceph-), o a Penicilina
- Usted tiene una enfermedad seria como de los riñones, corazon e higado

Como debería de tomarme la medicina?

- Usted recibira 2 pastillas rosadas de 500mg de Azithromycin (para Clamidia) y 2 pastillas blancas o anaranjadas de 200mg de Cefpodoxime (para Gonorrea)
- Tome una pastilla de Azithromycin y una pastilla de Cefpodoxime a la misma vez con comida y con un vaso lleno de agua
- Esta medicina puede causarle un malestar de estomago, diarrea, nausea, o vomito. Esto no debería de durar mucho tiempo. Pero, si estos sintomas continuan o desarrolla un sarpullido o fiebre, llame a su doctor o a City Clinic
- No comparta, ni le de esta medicina a nadie mas
- No debe de tener relaciones sexuales por los proximos 7 dias porque durara 7 dias para que la medicina combata la infeccion. Si tiene relaciones sexuales sin proteccion durante los 7 dias despues de tomar la medicina, podria infectar a su(s) pareja(s)
- Recomendamos que se vuelva a examinar en 3 meses para que este seguro/a de no estar infectado/a otravez

Que puedo hacer si todavia tengo preguntas?

Si tiene preguntas sobre esta medicina, por favor llame al (415) 487-5595 durante las horas de clinica. Todas las llamadas son confidenciales. Tambien puede venir a City Clinic para una visita de bajo costo o gratis que incluye: examen, prueba y medicina. Para mas informacion y direcciones, visite nuestra pagina de internet.

City Clinic	Lunes	8 am – 4pm
356 7 th Street	Martes	1 pm – 6 pm
San Francisco, CA 94103	Miercoles	8 am – 4 pm
(415) 487-5500	Jueves	1 pm – 4 pm
www.sfcityclinic.org	Viernes	8 am – 4 pm



A landmark in prevention