

Gonorrea

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por un tipo de bacteria (*Neisseria gonorrhoea*) que puede infectar la garganta, la vagina, la uretra y el ano. Puede transmitirse de una persona a otra durante las relaciones sexuales. También se puede propagar a un recién nacido durante el parto y provocar problemas graves.

¿En qué debo fijarme?

Personas con pene:

Los síntomas en el pene generalmente se presentan en un plazo de 10 días después de la exposición, y pueden incluir:

- Secreciones en el pene
- Dolor o comezón en el glande
- Hinchazón ocasional del pene
- Dolor al orinar
- En ocasiones, pudieran presentarse secreciones y luego desaparecer sin tratamiento. Sin embargo, la infección pudiera persistir.

Garganta:

La gonorrea se puede contagiar a la garganta mediante un pene infectado. La mayoría de las ocasiones no se presentan síntomas, aunque pudiera presentarse un dolor de garganta.

Recto:

Si la gonorrea infecta el ano/recto, pudiera haber secreciones, dolor, sangrado o comezón anal. Al igual que en la garganta, es posible que no se presente ningún síntoma.

Personas con vagina:

A menudo no hay síntomas. Si hay síntomas, estos generalmente se presentan en un plazo de 10 días después de la exposición, y pueden incluir:

- Secreciones de la vagina
- Dolor en la parte baja del abdomen, especialmente durante el sexo
- Sangrado vaginal inusual y cólicos
- Dolor al orinar

¿Es grave la gonorrea?

- Puede serlo. La gonorrea puede provocar una infección grave del epidídimo/testículos (los huevos) que puede causar dolor y provocar infertilidad (bloqueo de los espermatozoides). En las personas con vagina, la gonorrea puede provocar una infección grave denominada enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). La EIP puede dañar las trompas de Falopio y hacer más probable un "embarazo tubárico" (fuera del útero). La EIP también puede provocar infertilidad, es decir, la incapacidad para embarazarse.

- La gonorrea puede aumentar el riesgo de contraer y contagiar el VIH y otras ITS. Si se le ha diagnosticado gonorrea, asegúrese de hacerse también una prueba de VIH. La gonorrea rectal le pone en un riesgo particularmente alto de contraer VIH. *Si ha contraído gonorrea rectal y es seronegativo, hable con su proveedor de atención a la salud sobre la PrEP.*

¿Cómo se trata la gonorrea?

- El tratamiento recomendado para la gonorrea es una inyección de un antibiótico que curará la infección. Evite tener relaciones sexuales durante siete días después de su tratamiento y hasta que los síntomas hayan desaparecido.
- Su(s) pareja(s) sexual(es) debe(n) examinarse y recibir tratamiento. Si no recibe(n) un tratamiento, podría(n) contagiarle la infección de nuevo a usted o infectar a otras personas.
- Vuelva a hacerse la prueba de la gonorrea en 3 meses. Si tiene gonorrea en la garganta, es posible que le pidan que repita el exudado faríngeo (muestra de la garganta) unas 2 semanas después del tratamiento.

¿Cómo puedo evitar contraer gonorrea?

- Los condones son eficaces para reducir el riesgo de infección.
- Pregunte a su proveedor de atención a la salud sobre doxy-PEP.
- No mantenga relaciones sexuales si usted o su pareja tienen síntomas de una ITS, como secreción, ardor al orinar, erupción cutánea o llagas genitales.

Para obtener más información:

Por favor hable con su médico de la Clínica de la Ciudad o con su propio proveedor de cuidado de la salud. Los siguientes sitios web también tienen información útil:

ITS en general

www.ashasexualhealth.org (también en español)
www.cdc.gov/std/
www.sfcityclinic.org
www.sfsi.org/

Información sobre anticonceptivos y sexo/ITS

www.bedsider.org

Adolescentes

www.iwannaknow.org
www.kidshealth.org/teen (también en español)
www.scarleteen.com

Para un chequeo o tratamiento, consulte su profesional de la salud o clínica local, o acuda a:



Clínica de la Ciudad
 356 7th Street
 (entre Folsom y Harrison)
 San Francisco, CA 94103
 (628) 217-6600
www.sfcityclinic.org