

Mycoplasma genital

Mycoplasma genitalium (MG) es una infección de transmisión sexual que puede contagiarse de una persona a otra durante las relaciones sexuales. El MG infecta la uretra (en personas con pene) y el cuello uterino (en personas con vagina). No sabemos mucho sobre las infecciones de MG rectales y de garganta en este momento.

¿Cómo puedo contraer el M. Gen (Mycoplasma genitalium)?

El MG se transmite durante las relaciones sexuales vaginales, anales y probablemente orales.

¿En qué debo fijarme?

Personas con vagina:

- Secreciones vaginales
- Sangrado vaginal inusual o sangrado después de mantener relaciones sexuales
- Ardor o dolor al orinar
- Dolor abdominal bajo o dolor durante las relaciones sexuales

Personas con pene:

- Ardor o dolor en el interior del pene al orinar.
- Dolor o comezón en el glande
- Secreciones en el pene
- Dolor, sensibilidad o inflamación de uno o de los dos testículos

Aunque sabemos que las personas sin síntomas pueden ser portadoras del MG, a diferencia de la gonorrea o la clamidia no existen indicaciones actuales que recomienden que las personas sin síntomas se hagan la prueba. Por ello, la Clínica de la Ciudad sólo realiza pruebas a personas con síntomas o parejas de personas diagnosticadas con MG.

¿Es grave el MG?

Puede serlo. El MG puede causar una infección grave de los testículos (los huevos). En las personas con vagina, el MG puede provocar una infección grave llamada enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). La EIP puede dañar las trompas de Falopio y elevar las probabilidades de que una persona tenga un "embarazo ectópico" (fuera del útero), el cual puede llegar a provocar la muerte. La EIP también puede provocar infertilidad, es decir, la incapacidad para embarazarse.

¿Cómo se trata el MG?

- El MG se trata con antibióticos. El tratamiento recomendado para el MG es 7 días de doxiciclina dos veces al día, seguidos inmediatamente por 7 días de moxifloxacino una vez al día. Es importante terminar todas las pastillas que le receten, incluso si se siente mejor antes de tomarlas todas.

- No proporcionamos paquetes de pareja para MG. Sus parejas sexuales deben someterse a la prueba del MG y recibir tratamiento si el resultado es positivo. De lo contrario, podría(n) contagiarle la infección de nuevo a usted o infectar a otras personas.
- No mantenga relaciones sexuales hasta que termine el tratamiento y se hayan resuelto todos los síntomas.

¿Cómo puedo evitar contraer o propagar el MG?

- Los condones son eficaces para reducir el riesgo de infección.
- No tenga sexo si usted o su pareja sexual tiene alguna secreción anormal, ardor cuando orina, u otro síntoma que pudiera ser consecuencia de una ITS.

Para obtener más información:

Por favor hable con su médico de la Clínica de la Ciudad o con su propio proveedor de cuidado de la salud. Los siguientes sitios web también tienen información útil:

ITS en general

www.ashasexualhealth.org (también en español)
www.cdc.gov/std/
www.sfcityclinic.org
www.sfsi.org/

Información sobre anticonceptivos y sexo/ITS

www.bedsider.org

Adolescentes

www.iwannaknow.org
www.kidshealth.org/teen (también en español)
www.scarleteen.com

Para un chequeo o tratamiento, consulte a su profesional de la salud o clínica local, o acuda a:



Clínica de la Ciudad
 356 7th Street
 (entre Folsom y Harrison)
 San Francisco, CA 94103
 (628) 217-6600
www.sfcityclinic.org