

Бактериальный вагиноз(БВ)

«БВ» (бактериальный вагиноз) - это заболевание, при котором изменяется количество видов бактерий во влагалище. Причина этих изменений до конца не известна. Сексуальная активность и наличие нового полового партнера могут повысить риск развития БВ. Существует лекарственный препарат, который может уменьшить количество бактерий, вызывающих БВ.

Как узнать, что у меня БВ?

У вас может быть любой из следующих симптомов:

- Серые, желтые или белые выделения из влагалища с «рыбным» запахом.
- Зуд вокруг влагалища.
- У многих людей с БВ нет никаких симптомов.

Является ли БВ опасным заболеванием?

- Во время беременности бактериальный вагиноз может стать причиной преждевременных родов.
- Если у женщины есть БВ и ей предстоит гинекологическая процедура (например, хирургический аборт или гистерэктомия), лучше всего пролечить БВ до процедуры, если это возможно.
- Если женщина не беременна и у нее нет симптомов БВ, принимать лекарство не обязательно.
- БВ может привести к повышению вероятности заражения другими ИППП.

Как избежать появления БВ?

- Не спринцуйтесь (не промывайте влагалище водой или другой жидкостью)! Считается, что спринцевание увеличивает количество бактерий, вызывающих БВ, во влагалище и вымывает полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровье влагалища. Кроме того, спринцевание связано с воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) - серьезной инфекцией матки, труб и яичников.
- Обязательно пройдите полный медикаментозный курс лечения от БВ, даже если симптомы уже исчезли.
- Ограничьте количество сексуальных партнеров.
- Если у вас часто возникает БВ, проконсультируйтесь с врачом о профилактике.
- Некоторые женщины заражаются БВ снова и снова, особенно после секса. **Использование презервативов помогает предотвратить заражение.**
- Люди могут переносить БВ во влагалище партнеров во время секса, если пользуются общими сексуальными игрушками. Мойте игрушки между использованием или надевайте на них презервативы, чтобы предотвратить это.

Как лечится БВ?

- Можно применять такие лекарственные препараты, как метронидазол или клиндамицин, в виде таблеток или вагинального крема.
- Если у вашего партнера есть половой член, ему не нужно лечиться от БВ.
- Не существует пробиотических добавок, доказавших свою эффективность в лечении или профилактике БВ.

ПОДРОБНЕЕ

Для получения дополнительной информации:

Проконсультируйтесь с врачом клиники City Clinic или своим лечащим врачом. Также полезную информацию можно найти на следующих сайтах:

Общие сведения об ИППП

www.ashasexualhealth.org (также на испанском языке)

www.cdc.gov/std/

www.sfcityclinic.org

www.sfsi.org/

Контрацепция и информация об ИППП/сексе

www.bedsider.org

Подростки

www.iwannaknow.org

www.kidshealth.org/teen (также на испанском языке)

www.scarleteen.com

Чтобы пройти обследование на ИППП или лечение,
обратитесь к своему лечащему врачу, в местную клинику или приходите в:



City Clinic
356 7-я улица
(между Folsom и Harrison)
Сан-Франциско, Калифорния, 94103
(628) 217-6600
www.sfcityclinic.org