

## 生殖器支原體

生殖器支原體 (M. gen) 是一種性傳播感染，可在性行為過程中在人與人之間傳播。M. gen 會感染尿道（有陰莖的人）和子宮頸（有陰道的人）。目前我們對直腸和咽喉的 M.gen 感染知之甚少。

### M.gen 是如何感染上的？

M. gen 在陰道性交、肛交、可能還在口交過程中傳播。

### 我該注意什麼？

#### 有陰道的人：

- 陰道分泌物
- 異常陰道出血或性交後出血
- 排尿時有燒灼感或疼痛
- 下腹痛或在性行為時疼痛

#### 有陰莖的人：

- 排尿時陰莖內部有燒灼感或疼痛
- 陰莖頭疼痛或搔癢
- 陰莖有分泌物
- 睪丸疼痛、壓痛或腫脹

儘管我們知道無症狀者也可能攜帶 M.gen，但與淋病或衣原體不同，目前沒有證據建議對無症狀者進行篩檢。因此，City Clinic 只對有症狀者或確診 M. gen 的患者的伴侶進行檢查。

### M. gen 是否嚴重？

有可能嚴重！M. gen 可能會導致睪丸（蛋蛋）嚴重感染。對於有陰道的人來說，M. gen 可能會導致一種稱為盆腔炎 (PID) 的嚴重感染。PID 會損傷輸卵管並增加「輸卵管妊娠」（子宮外妊娠）的可能性，這可能是致命的。PID 還可能導致不孕 — 無法懷孕。

### 如何治療 M. gen？

- M. gen 可用抗生素治療。M.gen 的建議治療方法是服用強力黴素 7 天，每天兩次，然後立即服用莫西沙星 7 天，每天一次。務必要服完醫師開的所有藥物，即使您在服完之前已經感覺好轉。
- 我們不提供 M.gen 的伴侶套組。您的性伴侶應接受 M.gen 檢測，如果檢測結果呈陽性，則應接受治療。否則，他們可能會將病毒傳染給您或其他人。
- 在完成治療和所有症狀消失之前，不要發生性行為。

## 如何避免感染或傳播 *M. gen* ?

- 避孕套可有效降低感染風險。
- 若您或您的性伴侶出現異常分泌物、排尿燒灼感或任何其他可能由 STI 引起的症狀，請勿發生性行為。

### 如需了解更多資訊：

請諮詢您的 City Clinic 臨床醫師或您自己的醫療照護提供者。以下網站也提供了有用的資訊：

#### 一般 STI

[www.ashasexualhealth.org](http://www.ashasexualhealth.org) (也提供西班牙語版本)

[www.cdc.gov/std/](http://www.cdc.gov/std/)

[www.sfcityclinic.org](http://www.sfcityclinic.org)

[www.sfsi.org/](http://www.sfsi.org/)

#### 青少年

[www.iwannaknow.org](http://www.iwannaknow.org)

[www.kidshealth.org/teen](http://www.kidshealth.org/teen) (也提供西班牙語版本)

[www.scarleteen.com](http://www.scarleteen.com)

#### 避孕和 STI/性訊息

[www.bedsider.org](http://www.bedsider.org)

如需進行性傳播感染 (STI) 檢查或治療，  
請諮詢您的醫療照護提供者、當地診所，或前往：



City Clinic  
356 7th Street  
(Folsom 與 Harrison 之間)  
San Francisco, CA 94103  
(628) 217-6600  
[www.sfcityclinic.org](http://www.sfcityclinic.org)