

## Микоплазма гениталиум

Микоплазма гениталиум (*M. gen*) - это инфекция, передающаяся половым путем от одного человека к другому во время секса. *M. gen* заражает уретру (у людей с половым членом) и шейку матки (у людей со влагалищем). Об инфекциях *M. gen* прямой кишки и горла на данный момент известно немного.

### Как я могу заразиться *M. gen*?

*M. gen* передается во время вагинального, анального и, возможно, орального секса.

### На что следует обратить внимание?

#### Люди с влагалищем:

- Выделения из влагалища
- Необычные вагинальные кровотечения или кровотечения после секса
- Жжение или боль при мочеиспускании
- Боль в нижней части живота или боль во время секса

#### Люди с половым членом:

- Жжение или боль внутри пениса при мочеиспускании
- Боль или зуд в области головки полового члена
- Выделения из полового члена
- Боль, болезненность или отек яичка (яичек)

Хотя мы знаем, что люди при отсутствии симптомов могут быть носителями *M. gen*, в отличие от гонореи или хламидиоза, в настоящее время нет оснований рекомендовать обследование людей без симптомов. В связи с этим City Clinic проводит обследование только людей с симптомами или партнеров людей, у которых диагностирован *M. gen*.

### Опасно ли заболевание *M. gen*?

Да, заболевание может быть опасно! *M. gen* вызывает тяжелую инфекцию яичек (яйцеклеток). У людей с влагалищем *M. gen* может привести к тяжелой инфекции, называемой воспалительным заболеванием органов малого таза (ВЗОМТ). ВЗОМТ повреждает фаллопиевы трубы и повышает вероятность «трубной (внематочной) беременности», что приводит к летальному исходу. ВЗОМТ также приводит к бесплодию - невозможности забеременеть.

### Как лечится *M. gen*?

- *M. gen* лечится с помощью антибиотиков. Рекомендуемый курс лечения *M. gen* составляет 7 дней доксициклина дважды в день, а затем 7 дней моксифлоксацина один раз в день. Важно пропить полный курс, который вам назначили, даже если вы почувствовали себя лучше до того, как приняли все таблетки.
- Мы не предоставляем пакет для лечения *M. gen* у партнеров. Ваши половые партнеры должны сдать тест на *M. gen* и пройти лечение, если их тест окажется положительным. В противном случае они могут передавать инфекцию вам или заразить других.
- Не занимайтесь сексом, пока не пройдете полный курс лечения и не исчезнут все симптомы.

## Как я могу избежать заражения или распространения *M. gen*?

- Использование презервативов эффективно снижает риск заражения.
- Не занимайтесь сексом, если у вас или у вашего сексуального партнера есть аномальные выделения, жжение при мочеиспускании или любые другие симптомы, которые могут быть вызваны ИППП.

### Для получения дополнительной информации:

Проконсультируйтесь с врачом клиники City Clinic или своим лечащим врачом. Также полезную информацию можно найти на следующих сайтах:

#### **Общие сведения об ИППП**

[www.ashsexualhealth.org](http://www.ashsexualhealth.org) (также на испанском языке)

[www.cdc.gov/std/](http://www.cdc.gov/std/)

[www.sfcityclinic.org](http://www.sfcityclinic.org)

[www.sfsi.org/](http://www.sfsi.org/)

#### **Контрацепция и информация об ИППП/сексе**

[www.bedsider.org](http://www.bedsider.org)

#### **Подростки**

[www.iwannaknow.org](http://www.iwannaknow.org)

[www.kidshealth.org/teen](http://www.kidshealth.org/teen) (также на испанском языке)

[www.scarleteen.com](http://www.scarleteen.com)

Чтобы пройти обследование на ИППП или лечение, обратитесь к своему лечащему врачу, в местную клинику или приходите в:



City Clinic  
356 7-я улица  
(между Folsom и Harrison)  
Сан-Франциско, Калифорния, 94103  
(628) 217-6600  
[www.sfcityclinic.org](http://www.sfcityclinic.org)