

ВЗОМТ

Воспалительное заболевание органов малого таза (**ВЗОМТ**) - это опасная инфекция, которая вызывается бактериями, проникающими из влагалища через шейку матки (отверстие в матке) в матку, фаллопиевы трубы или яичники. Эти бактерии вызывают воспаление, боль и приводят к образованию рубцовой ткани. ВЗОМТ обычно вызывается гонореей или хламидиями - двумя типами бактерий, передающихся половым путем. Оно также связано с инфекциями, которые не передаются половым путем, например бактериальным вагинозом (БВ). ВЗОМТ является основной причиной бесплодия (утраты способности забеременеть).

Как передается ВЗОМТ?

Чаще всего бактерии, вызывающие ВЗОМТ, попадают с полового члена во влагалище во время вагинального секса. Человек может быть инфицирован гонореей или хламидиями без каких-либо симптомов.

Как узнать, что у меня ВЗОМТ?

У вас может быть любой из следующих симптомов:

- Боль в животе во время секса
- Боль в нижней части спины
- Умеренная или сильная боль в нижней части живота
- Лихорадка, озноб или рвота
- Необычное кровотечение или выделения из влагалища.

Является ли ВЗОМТ опасным заболеванием?

Да! ВЗОМТ вызывает:

- Образование рубцов в области матки, фаллопиевых труб и яичников. Приводит к бесплодию (невозможности забеременеть) и/или длительной боли в области таза.
- Является причиной беременности в фаллопиевых трубах, а не в матке («внематочная» или «трубная» беременность). В этом случае необходима срочная операция и удаление фаллопиевой трубы (труб).

Как лечится ВЗОМТ?

- Вам будут назначены антибиотические препараты, которые лечат гонореей и хламидиоз (наиболее распространенные инфекции, вызывающие ВЗОМТ) и другие вагинальные инфекции, такие как бактериальный вагиноз (БВ).
- Если ВЗОМТ протекает в тяжелой форме, необходима госпитализация.
- Обязательно посещайте клинику или больницу для прохождения всех последующих медицинских осмотров, чтобы убедиться, что заболевание проходит.
- Не вступайте в половые отношения как минимум 2 недели, чтобы дать организму полностью выздороветь и избежать передачи инфекции кому-либо еще.
- Пропейте прописанный курс полностью, даже если вам стало лучше до того, как вы его закончили.
- Ваши половые партнеры также должны пройти обследование и лечение, иначе вы можете заразиться снова.

Как избежать ВЗМ?

- Использование презервативов эффективно снижает риск заражения.
- Не занимайтесь сексом, если у вас или у вашего сексуального партнера есть симптомы ИППП, включая выделения, жжение при мочеиспускании, сыпь или язвы на половых органах.
- Избегайте спринцевания. Спринцевание способствует росту болезнетворных бактерий во влагалище, а также продвигает бактерии вверх к матке и фаллопиевым трубам.

Для получения дополнительной информации:

Проконсультируйтесь с врачом клиники City Clinic или своим лечащим врачом. Также полезную информацию можно найти на следующих сайтах:

Общие сведения об ИППП

www.ashasexualhealth.org (также на испанском языке)

www.cdc.gov/std/

www.sfcityclinic.org

www.sfsi.org/

Контрацепция и информация об ИППП/сексе

www.bedsider.org

Подростки

www.iwannaknow.org

www.kidshealth.org/teen (также на испанском языке)

www.scarleteen.com

Чтобы пройти обследование на ИППП или лечение, обратитесь к своему лечащему врачу, в местную клинику или приходите в:



City Clinic
356 7-я улица
(между Folsom и Harrison)
Сан-Франциско, Калифорния, 94103
(628) 217-6600
www.sfcityclinic.com