

梅毒

梅毒是一種性傳播感染 (STI)，由一種名為梅毒螺旋體的細菌引起。它可以透過陰道性交、肛交或口交中的身體接觸在人與人之間傳播。通常，症狀會在接觸梅毒後 2-12 週出現。

梅毒有哪些症狀？

早期可能出現的症狀：（感染後 2-12 週）。這稱為初期梅毒。

- 出現稱為硬下疳的潰瘍。可能不只一個。通常並不疼痛。可能出現在陰莖、陰囊、陰道唇、肛門或口腔上。如果看不到或感覺不到這些潰瘍，您可能不會注意到它們，因為它們可能長在陰道、口腔或肛門內。**即使不進行治療，這些潰瘍也會在幾週後消失，但您仍然會受到感染，並可能感染性伴侶。**
- 潰瘍附近的淋巴腺可能會腫脹，但不會疼痛。

後期可能出現的症狀：（感染後 4-12 週）。這稱為二期梅毒。

- 類似流感的疾病，伴有咽喉疼痛、頭痛和發燒。
- 全身出現皮疹，有時手掌和腳底也會出現皮疹（不癢）。
- 生殖器上出現皮疹。
- 生殖器上或肛門周圍可能出現疣狀贅生物。
- 舌頭或咽喉上可能會出現淺灰色/白色斑塊，並伴有咽喉疼痛。
- 可能會發現斑片狀脫髮。
- 神經系統症狀：頸部僵硬、噁心、嘔吐、癲癇發作、聽力喪失、眼睛發紅疼痛。**即使不進行治療，這些症狀也會在幾週後消失，但您仍然會受到感染，並可能感染性伴侶。**

如何知道自己是否患有梅毒？

- 如果您的生殖器、肛門有潰瘍或出現皮疹，請進行 STI 檢查。City Clinic 提供特殊檢測，可在您就診當天診斷梅毒。
- 通常，梅毒可能會被忽視，但透過血液檢查可以確診。

梅毒是否危險？

- 梅毒可能會感染大腦、眼睛和耳朵，導致劇烈頭痛、頸部僵硬、癲癇發作、眼睛發紅疼痛、視力下降或聽力喪失。
- 患有梅毒的孕婦會將感染傳染給嬰兒，從而給嬰兒帶來許多健康問題。
- 梅毒和愛滋病病毒 (HIV) 通常同時存在。初期梅毒的潰瘍可以使 HIV 更容易傳染給伴侶或從伴侶那裡傳染。
- 如果您患有梅毒但 HIV 呈陰性，您將在診斷梅毒的同時接受 HIV 檢測。如果您的檢測結果為陰性，請與您的醫療照護提供者討論暴露前預防 (PrEP)。
- 如果您的 HIV 呈陽性且未接受 HIV 藥物治療，梅毒可能會使您的 HIV 疾病惡化。

如何治療梅毒？

- 青黴素可以治愈梅毒。如果確實對青黴素過敏，可以使用其他藥物。

- 我們有時會對不再有性生活的人進行梅毒診斷。他們可能在多年前就已受到感染。我們建議對他們進行治療，因為有些梅毒患者長期不治療，會對大腦、心臟和神經系統造成傷害。梅毒晚期患者不會傳染給性伴侶。

如果我患有梅毒，該怎麼辦？

- 您的性伴侶應接受檢查和治療。如果不接受治療，他們可能會將病毒傳染給您或其他人。
- 即使接受治療後，您的梅毒血液檢查仍可能呈陽性（不正常）。治療完成後，您就不再具有傳染性。請從現在開始，讓對您進行梅毒檢測的任何醫療照護提供者知道您過去曾接受過治療。
- 您需要在治療後三個月接受評估，然後在診斷和治療的第一年內定期接受評估。這包括檢查和血液檢查。

如何避免感染梅毒？

- 避孕套可有效降低感染風險。
- 向您的醫療照護提供者諮詢有關 doxy-PEP 的資訊。
- 若您或您的性伴侶出現 STI 症狀，包括分泌物、排尿燒灼感、皮疹或生殖器潰瘍，請不要發生性行為。

當我確診梅毒時，會有什麼後果？

公共衛生部疾病控制調查員將與您聯絡。他們將幫助您更好地了解自己的感染情況，並為您提供保護您未來健康所需的資訊，並幫助您的伴侶接受治療。

如需了解更多資訊：

請諮詢您的 City Clinic 臨床醫師或您自己的醫療照護提供者。以下網站也提供了有用的資訊：

一般 STI

www.ashsexualhealth.org（也提供西班牙語版本）

www.cdc.gov/std/

www.sfcityclinic.org

避孕和 STI/性資訊

www.bedsider.org

www.scarleteen.com

青少年

www.iwannaknow.org

www.kidshealth.org/teen

（也提供西班牙語版本）

www.scarleteen.com

如需進行性傳播感染 (STI) 檢查或治療，
請諮詢您的醫療照護提供者、當地診所，或前往：



City Clinic
356 7th Street
(Folsom 與 Harrison 之間)
San Francisco, CA 94103
(628) 217-6600
www.sfcityclinic.org