

Sífilis Congénita (Sífilis de madre a hijo)

1. ¿Qué es la sífilis congénita?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por bacterias (gérmenes). La sífilis es fácil de curar. Sin tratamiento, puede hacerle daño a los órganos de su cuerpo. La sífilis congénita es cuando una mujer embarazada le pasa la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto. Puede causar que mujeres tengan a su bebé demasiado temprano o un aborto espontáneo o el bebé nacido muerto. También puede causar defectos de nacimiento graves en los bebés.

2. ¿Cómo se propaga esta enfermedad?

Usted puede contraer sífilis mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca. Puede que no pueda ver las llagas y no causan dolor. La sífilis congénita se propaga de una madre infectada a su bebé durante el embarazo o durante el parto.

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

A menudo las personas no presentan síntomas, por lo que ellos no saben que están infectadas. Señales de la sífilis pueden incluir una llaga cerca del área donde el germen entro a el cuerpo (vagina, ano, labios o boca) o salpullido en una o más áreas del cuerpo. La única manera de saber con seguridad es hacerse una prueba. Una prueba de detección de la sífilis es parte del cuidado prenatal (atención médica durante el embarazo).

4. ¿Cuándo debo hacerme la prueba?

La atención prenatal es muy importante para mantener a su bebé y a usted sanos. Debería hacerse la prueba de sífilis tres veces durante su embarazo: durante el primer trimestre, al principio del tercer trimestre (entre las semanas 28 y 32) y al momento del parto.

5. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad?

La sífilis puede ser tratada y curada, incluso durante el embarazo, con una inyección de antibióticos (medicamento que mata los gérmenes). Asegúrese de que su(s) pareja(s) sexual(es) se hagan una prueba y reciban tratamiento también. Esto les ayudará a mantenerse saludable y evitar contagiar a otras personas, y evitar infectarse de nuevo.

6. ¿Cómo se previene esta enfermedad?

- Use condones
- Vaya a sus visitas prenatales para las pruebas y el tratamiento lo antes posible. Si no tiene un médico, visite la clínica SF City Clinic localizada en 356 7th Street para encontrar dónde puede hacerse análisis y recibir tratamiento gratis.



Puntos claves:

- La sífilis congénita es cuando una mujer embarazada pasa la sífilis a su bebé durante embarazo o parto.
- Los síntomas comunes de la sífilis incluyen una llaga o salpullido, pero muchas personas no ven señales de la enfermedad.
- La sífilis es tratada y curada con antibióticos.
- El cuidado prenatal es muy importante para detectar y tratar la sífilis.

Para más información:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés)

<http://www.cdc.gov/std/pregnancy/stdfact-pregnancy.htm>

<http://www.cdc.gov/std/syphilis/stdfact-syphilis.htm>

Oficina de la Salud de la Mujer de los EE.UU.

<https://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/syphilis.html>