

**Paciente al que se le administra terapia de pareja por tricomoniasis  
(Metronidazol 500 mg dos veces al día durante 7 días)  
A los participantes se les asignó sexo femenino al nacer**

**LEA ESTO CON ATENCIÓN**

**¿Por qué debo tomar este medicamento?**

Su pareja sexual ha sido tratada recientemente por tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección curable que se contrae al mantener relaciones sexuales con una persona que ya la padece. Muchas personas con tricomoniasis no saben que la padecen porque se sienten bien y no presentan ningún síntoma. Sin embargo, si no se toman medicamentos para curarla, se puede enfermar gravemente.

Podría tener tricomoniasis. Es importante que reciba tratamiento. Queremos asegurarnos de que reciba el medicamento que necesita lo antes posible. La mejor manera de cuidarse es acudir al médico o a City Clinic para que le haga un chequeo y le recete medicamentos. Si no puede acudir a su médico o a City Clinic en el plazo de una semana, deberá tomar el medicamento adjunto.

**¿El medicamento es seguro?**

El medicamento es muy seguro. No obstante, debe hablar con su médico o acudir a City Clinic si tiene alguno de los problemas que se indican a continuación. **NO tome el medicamento si:**

- Sabe que está embarazada, cree que podría estarlo o planea quedarse embarazada.
- Es mujer y tiene dolor en el bajo vientre, dolor al mantener relaciones sexuales, vómitos o fiebre.
- Tuvo alguna vez una reacción adversa, erupción o alergia al metronidazol (Flagyl).
- Padece una enfermedad grave de larga duración, como una afección renal, cardíaca o hepática.

**¿Cómo debo tomar el medicamento?**

- Recibirá 14 comprimidos de 500 mg de metronidazol.
- Tome un comprimido dos veces al día durante siete días. Tome la medicación con un vaso lleno de agua.
- Este medicamento puede causar malestar estomacal, diarrea, náuseas, vómitos u oscurecimiento de la orina. Esto no debería durar mucho tiempo. Si estos síntomas persisten o desarrolla una erupción cutánea o fiebre, póngase en contacto con su médico o con City Clinic.
- No beba alcohol durante las 24 horas siguientes a la toma del medicamento. Podría hacerle sentir muy mal.
- No comparta ni dé este medicamento a nadie.
- No mantenga relaciones sexuales durante los 7 días siguientes a la administración del medicamento, ya que tarda 7 días en curar la tricomoniasis. Si mantiene relaciones sexuales sin protección durante los 7 días posteriores a la toma del medicamento, aún podría transmitir la infección a sus parejas sexuales.
- Recomendamos volver a realizar la prueba en 3 meses para asegurarse de que no se haya vuelto a infectar.

**¿Qué puedo hacer si sigo teniendo dudas?**

Si tiene alguna duda o consulta sobre el medicamento, llame al 628-217-6600 durante el horario de la clínica. Todas las llamadas son confidenciales. También puede acudir a City Clinic para una visita que incluye: examen, pruebas y medicamentos. Para obtener más información o indicaciones para llegar, visite nuestro sitio web: **[www.sfcityclinic.org](http://www.sfcityclinic.org)**.

City Clinic  
356 7<sup>th</sup> Street  
San Francisco, CA 94103  
628-217-6600  
[www.sfcityclinic.org](http://www.sfcityclinic.org)

Lunes  
Martes  
Miércoles  
Jueves 8:00 a 11:00 a. m.  
Viernes

8:00 a. m. a 4:00 p. m.  
1:00 p. m. a 6:00 p. m.  
8:00 a. m. a 4:00 p. m.  
1:00 a 4:00 p. m.  
8:00 a. m. a 4:00 p. m.

