

Indicaciones para el Tratamiento de Parejas Sexuales con Clamidia y Gonorrea (Doxycycline 100mg y Cefixime 800mg)

POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE

Porque es necesario que yo tome esta medicina?

Recientemente su pareja sexual ha recibido tratamiento para *Clamidia* y *Gonorrea*. *Clamidia* y *Gonorrea* son infecciones curables que se pueden adquirir cuando se tiene relaciones sexuales con alguien que ya las tiene. Muchas personas con estas infecciones no saben que las tienen porque aparentemente se sienten bien y no tienen síntomas. Sin embargo, si usted no se toma la medicina para curarse, se puede poner muy enfermo/a.

Usted podría tener *Gonorrea* y/o *Clamidia*. Es importante que reciba tratamiento. Nosotros queremos estar seguros que usted reciba la medicina lo más pronto posible. **El mejor tratamiento para Clamidia y Gonorrea es una pastilla y una inyección antibiótico. Solamente puede recibir la inyección en City Clinic o en la oficina de su doctor.** Si usted no puede ir con su doctor o venir a City Clinic dentro de una semana, debería de tomarse la medicina que está incluida con este folleto.

Es esta medicina segura?

Esta medicina es muy segura. Sin embargo, debería de hablar con su doctor o venir a City Clinic si tiene unos de los problemas que se encuentra en la siguiente lista. **NO TOME la medicina si:**

- Usted es una mujer que esta o piensa que podría estar embarazada
- Usted es una mujer y tiene dolor de estomago, dolor al tener relaciones sexuales, vomito o fiebre
- Usted es un hombre y tiene dolor o inflamación en los testículos o fiebre
- Usted ha tenido una reacción, sarpullido o alergia a Doxycycline o otros antibióticos con Tetracycline
- Usted ha tenido una reacción, sarpullido o alergia a Cefixime (Suprax), Cefpodoxime (Vantin), a cualquier Cephalosporin (antibióticos que comienzan con cef- o ceph-), o una reacción a Penicilina
- Usted tiene una enfermedad seria de los riñones, corazón e hígado

Como debería de tomarme la medicina?

- Usted recibirá 14 pastillas de 100mg de Doxycycline (para Clamidia) y dos pastillas blancas de 400mg de Cefixime (para Gonorrea).
- Tome las dos pastillas de Cefixime un vez y continúe con la pastilla de Doxycycline dos veces al día por 7 días después de comer (por ejemplo después de desayunar o de cenar). Asegúrese de terminarse toda la medicina.
- Tome las pastillas de Cefixime y Doxycycline con comida y con un vaso lleno de agua.
- Esta medicina puede causarle un malestar de estomago, diarrea, nausea, o vomito. Esto no debería de durar mucho tiempo. Pero, si estos síntomas continúan o desarrolla un sarpullido o fiebre, llame a su doctor o a City Clinic.
- Evite exposición o contacto prolongado con el sol mientras que está tomando esta medicina
- No comparta, ni le de esta medicina a nadie mas.
- No debe de tener relaciones sexuales por los próximos 7 días porque durara 7 días para que la medicina combate la infecciones. Si tiene relaciones sexuales sin protección durante los 7 días después de tomar la medicina, podría infectar a su(s) pareja(s)
- Recomendamos que se vuelva a examinar en 3 meses para que este seguro/a de no estar infectado/a otra vez.

Que puedo hacer si todavía tengo preguntas?

Si tiene preguntas sobre esta medicina, por favor llame al (415) 487-5595 durante las horas de clínica. Todas las llamadas son confidenciales. También puede venir a City Clinic para una visita que incluye: examen, prueba y medicina. Para más información y direcciones, visite nuestra página de internet.

City Clinic	Lunes	8 am – 4pm
356 7 th Street	Martes	1 pm – 6 pm
San Francisco, CA 94103	Miércoles	8 am – 4 pm
(415) 487-5500	Jueves	1 pm – 4 pm
www.sfcityclinic.org	Viernes	8 am – 4 pm



A landmark in prevention